

STADES DE LA MALADIE PARODONTALE DU CHAT



La **maladie parodontale** est le diagnostic **le plus fréquemment établi** en clinique chez **le chat**¹.

Une étude rapporte que **50% des chats de 4 ans ou plus** présentent une maladie parodontale **sur au moins une dent**, il ressort même que **94 % des chats de plus de 8 ans** montrent des **signes de lyse osseuse alvéolaire**².



STADE 1
GINGIVITE

PERTE D'ATTACHE

0 %

Détartrage/polissage

STADE 2
PARODONTITE DÉBUTANTE

< 25%

Détartrage/polissage
+/- extractions dentaires
selon l'inflammation

STADE 3
PARODONTITE MODÉRÉE

entre 25 et 50 %

Détartrage/polissage
et extractions dentaires



STADE 4
PARODONTITE MARQUÉE

> 50%

Détartrage/polissage
et extractions dentaires



Pour limiter l'évolution de la maladie parodontale, des soins quotidiens d'hygiène bucco-dentaire par les propriétaires sont conseillés afin de limiter l'accumulation de plaque dentaire : le brossage dentaire est le soin le plus efficace il peut être complété par l'administration d'une solution diluée dans l'eau de boisson.

Bibliographie

1. O'Neill DG, Church dB, McGreevy PD, et al. Prevalence of disorders recorded in cats attending primary-care veterinary practices in England. Vet J 2014 Nov;202(2):286-91.
2. Gengler W, dubielzig R and Ramer J. Physical examination and radiographic analysis to detect dental and mandibular bone resorption in cats; a study of 81 cases from necropsy. J Vet Dent 1995;12: 97-100.