

7 jours de sérénité continue

La douleur en médecine vétérinaire
La douleur est au cœur de la majorité des motifs de consultation en médecine vétérinaire¹

1. WSAVA. Guide pour la reconnaissance, l'évaluation et le traitement de la douleur. Document produit par les membres du WSAVA Global Pain Council members et les auteurs : Karol Mathews DVM DVSc DACVECC, 2020 • **2.** Enquête auprès de propriétaires de chiens (N=2008), Août 2023. Animalcare data on file. • **3.** RCP Daxocox®. • **4.** Homedes J, Ocak M, Riedel S and Salichs M (2024) A blinded, randomized and controlled multicenter field study investigating the safety and efficacy of longterm use of enflcoxib in the treatment of naturally occurring osteoarthritis in clientowned dogs. Front. Vet. Sci. 11:1349901. doi: 10.3389/fvets.2024.1349901. Etude portant sur 109 chiens pendant 6 mois en Hongrie et au Portugal. • **5.** Homedes J, Salichs M, Guzman A. Long-term safety evaluation of Daxocox® tablets (enflcoxib) in dogs after weekly oral administrations for seven months. BMC Vet Res. 2021 Jun 3;17(1):205. doi: 10.1186/s12917-021-02910-0. Cendros J-M, Salichs M, Encina G, Vela JM • **6.** Homedes J (2025) Enflcoxib for the long-term management of canine osteoarthritis—External validation of a population pharmacokinetic model in dogs with osteoarthritis. Front. Vet. Sci. 12:1645857. doi: 10.3389/fvets.2025.1645857. • **7.** Homedes J, Salichs M, Solà J, Menargues A, Cendrós JM, Encina G. Pharmacokinetics of enflcoxib in dogs: Effects of prandial state and repeated administration. J Vet Pharmacol Ther. 2021 Nov;44(6):888-901. doi: 10.1111/jvp.12995. Epub 2021 Jun 23. • **8.** Homedes J, Salichs M, Solà J, Menargues A, Cendrós JM, Encina G. Pharmacokinetics of enflcoxib in dogs: Effects of prandial state and repeated administration. J Vet Pharmacol Ther. 2021 Nov;44(6):888-901. doi: 10.1111/jvp.12995. Epub 2021 Jun 23.

DAXOCOX® 15 mg - DAXOCOX® 30 mg - DAXOCOX® 45 mg - DAXOCOX® 70 mg - DAXOCOX® 100 mg - DAXOCOX® 140 mg - DAXOCOX® 200 mg Comprimés pour chiens. **Composition :** Chaque comprimé contient : Substance active : Enflcoxib 15 mg, Enflcoxib 30 mg, Enflcoxib 45 mg, Enflcoxib 70 mg, Enflcoxib 100 mg, Enflcoxib 140 mg, Enflcoxib 200 mg. **Espèce cible :** Chiens. **Indications :** Pour le traitement de la douleur et de l'inflammation associées à l'arthrose (ou maladie dégénérative des articulations). Traitement de la douleur et de l'inflammation associées à une intervention chirurgicale orthopédique ou une excrèse de tissus mous. **Contre-indications :** Ne pas utiliser chez les animaux souffrant de troubles gastro-intestinaux, d'entéropathie avec perte de protéines ou de sang ou de troubles hémorragiques. Ne pas utiliser en cas d'altération de la fonction rénale ou hépatique. Ne pas utiliser en cas d'insuffisance cardiaque. Ne pas utiliser chez les chiennes en gestation ou en lactation. Ne pas utiliser chez les animaux destinés à la reproduction. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue aux sulfamides. Ne pas utiliser chez des animaux déshydratés, hypovolémiques ou hypotendus, car il existe un risque potentiel d'augmentation de la toxicité rénale. **Effets indésirables :** Chiens : Fréquent (1 à 10 animaux / 100 animaux traités) : Vomissements⁽¹⁾, diarrhées⁽¹⁾, selles molles⁽¹⁾. Peu fréquent (1 à 10 animaux / 1 000 animaux traités) : Apathie, perte de l'appétit, diarrhée hémorragique, ulcère gastrique. Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) : Taux élevé de l'urée sanguine (BUN), taux élevé de cholestérol (total). (1) La plupart des cas se rétablissent sans traitement. En cas d'effets indésirables, l'utilisation du médicament vétérinaire doit être arrêtée et un traitement de soutien général, comme lors de surdosage avec la clinique avec les AINS, doit être appliqué jusqu'à la disparition complète des signes cliniques. Une attention particulière doit être accordée au maintien du statut hémodynamique. Des protecteurs gastro-intestinaux et des solutions parentérales, selon le cas, peuvent être nécessaires pour les animaux présentant des effets indésirables gastro-intestinaux ou rénaux. **Catégorie :** Médicament vétérinaire soumis à ordonnance.

DAXOCOX[®] : 7 jours de sérénité continue

Contient de l'enflcoxib, avec un mode d'action unique³

- Inhibition sélective de COX-2
- Pharmacocinétique continue sur 7 jours⁸
- Sans effet cumulatif après des administrations répétées à la maison



Pour le Chien	Pour le Propriétaire	Pour la Clinique
7 Efficacité stable : Une concentration maintenue 7 jours.⁷ 7 Adapté aux douleurs et à l'inflammation liées à l'arthrose, ainsi qu'aux douleurs post-opératoires³ 7 Contribue au confort du chien⁴	7 Moins de stress, moins d'oubli : Une seule prise par semaine simplifie le quotidien. 7 Format pratique pour usage mensuel : Une boîte de 5 comprimés correspond désormais à 1 mois de traitement complet.	7 Pharmacie optimisée : Le seul AINS garantissant une couverture continue sur 7 jours. 7 Flexibilité et précision: - Nouveaux dosages pour gros chiens (140mg et 200mg) - Comprimés déconditionnables au besoin. 7 Amélioration clinique et innocuité démontrée jusqu'à 7 mois^{4,5,6}

* Etudes portant sur 32 chiens et 109 chiens

Tableau de posologie³

Nombre de comprimés à administrer

Poids net (Kg) / dosage comprimé (mg)	Première dose 8mg/Kg							Dose d'entretien 4mg/Kg						
	15 mg	30 mg	45 mg	70 mg	100 mg	140 mg	200 mg	15 mg	30 mg	45 mg	70 mg	100 mg	140 mg	200 mg
2,5 - 4,9	2							1						
5 - 7,5		2							1					
7,6 - 11,2			2							1				
11,3 - 17,5				2							1			
17,6 - 25					2							1		
25,1 - 35						2							1	
35,1 - 50							2							1
50,1 - 75						4							2	